

## ITU : CAUSA DE INFECCION MAS FRECUENTE EN PACIENTES PEDIATRICOS Y NEONATALES.

**Métodos existentes de recogida de orina en la infancia para la realización de urocultivo + perfil urinario.**

La recogida de orina mediante bolsa perineal ,es el método más utilizado en España en niños que no controlan la micción.Sin embargo , algunos estudios demuestran que presenta un alto riesgo de contaminación y un escaso valor predictivo,por lo que se ha considerad como un método de obtención de muestras de orina en pacientes pediátricos de bajo valor predictivo,siendo su principal función la de cribado por ser rápido y sencillo. La bolsa perineal ,si posee unas condiciones determinadas como la Bolsa de recogida Pediátrica y Neonato "TEMAPAR" y "TEMASAR"(1) ,puede ser un excelente método de toma de muestra fiable y seguro en pacientes pediátricos y neonatales ,ya que disminuye considerablemente el riesgo de contaminación y falsos positivos ,descendiendo a su vez, el empleo de la punción suprapúbica. Las condiciones que deben considerarse son:

\* Utilización de un protocolo de extracción adecuado que incluya entre otras variables la colocación de mascarilla,lavado de manos/esterilium,utilización de guante, desinfección de la zona con gasas estériles y en círculos,espera de al menos 30 segundos antes de colocar la bolsa al paciente.

\* Utilización de una bolsa de recogida adecuada (1).Doc.adjunto:

*Doc .adjuntoCaracterísticas Técnicas Bolsas de recogida de orina TEMAPAR/TEMASAR.*



**TEMAER**

Pol. El Cascajal - C/ Mirlos, 7 – 28320 Pinto (Madrid).

[www.temaer.es](http://www.temaer.es)

e-mail: [temaer@temaer.com](mailto:temaer@temaer.com)

Tfno: 916 924 648

Fax: 916 924 632